

Tarih: 13.09.2004 Saat: 16:59  
Konu: Ya#351;am ve Sa#287;l#305;k

## BADEMCÝK ÝLTÝHABI

Eđer çocuđunuzun bođazýna bakarsanız, bademciklerin kýzarmýp ve ıpımpırd olduklarıný görebilirsiniz. Bazen de, bademciklerin üzeri beyaz veya sarý renkli bir maddeyle kaplanmýp gibi olabilir. Çocuđunuzun bademciklerinin iltihaplı olup olmadıklarıný anlamayabilirsiniz; eđer bademcik iltihabýndan ıpıpheleniyorsanız doktorunuza bařvurunuz.

TANIM:Çocuđunuzda bademcik iltihabýnýn apađýdaki belirtilerinden biri veya birkaçý bulunabilir :

- &#8226; bođaz ađrýsý
  - &#8226; yutkunma sýrasýnda ađrý veya rahatsýzlyk hissi
  - &#8226; kötü ađyz kokusu
  - &#8226; ateř
  - &#8226; sesinde çatallanma
  - &#8226; boynundaki lenf bezlerinde ıpıpme
- Bademcik iltihabýnýn tedavisi / Ameliyat ne zaman gerekli?

Antibiyotikler sayesinde artýk her bademcik iltihabýnýn standart tedavisi, eskiden olduđu gibi ameliyat deđildir. Ancak, sýk tekrarlayan bođaz ađrýsý ve bademcik iltihabý halinde bunu bir doktorun deđerlendirmesi gerekir. Doktorunuz streptokok enfeksiyonu olup olmadıklarıný arařtırmak üzere bođaz kültürü yapýlmasýný isteyebilir. Streptokoklar, iltihaplanmaya neden olan bakteri türü mikroplardýr. Bakterilerin neden olduđu iltihaplarda da antibiyotik tedavisi iyi sonuç verir.

Doktorunuz apađýdaki durumlardan biri veya birkaçýnýn bulunması halinde bademcik ameliyatý önerebilir:

&#8226; çocuđunuzun solunumunu engelleyecek derecede bademciklerin büyümüp olması

&#8226; çocuđunuzda yutkunma güçlüđu bulunması

&#8226; sýk tekrarlayan bođaz ađrýsý

&#8226; sýk tekrarlayan bođaz iltihaplanması

&#8226; bademcik iltihabýnýn orta kulak iltihabý, sinüzit, vs. gibi komplikasyonlara neden olması

Bademcik ameliyatý (tonsillektomi) sýrasýnda neler olur?

Ne kadar sýk yapýlýyor veya basit görünüyor olursa olsun, her ameliyat çocuk ve ebeveynler için genellikle korkutucudur. Onu nelerin beklediđini anlatarak, çocuđunuzun kendini ameliyata hazýrlamasýna yardımcı olabilirsiniz.

Bademcik ameliyatýnda :

&#8226; çocuđunuz, genel anestezi verilerek uyutulacaktır. Bu, ameliyatın bir ameliyathanede yapýlacađý ve çocuđunuzun ameliyat sýrasýnda bir anestezi uzmaný tarafından izleneceđi anlamýný tařýr.

&#8226; çocuđunuz yaklařýk 20-30 dakika süreyle uyuyacaktır

&#8226; cerrah, bademcikleri çocuđunuzun ađzýnýn içinden alacaktır.

Bademcik ameliyatý için deride bir kesi yapýlmasýna gerek yoktur.

&#8226; cerrah, bademcikleri buldukları yerden bazı kesiler yaparak

çýkartacak ve kanamayý durduracaktır.

Çocuđunuz uyanma odasında ayýlacaktır. Solunum güçlüđü veya kanama belirtisi olmasý halinde tekrar ameliyathaneye alınmasý gerekebilir.

Genellikle hastanede toplam kalýp süresi 5-10 saat arasında olmaktadır.

Yeterli sývy gýda almaya başlamayan, 3 yaýın altında olan ve bayýlma nöbetleri gibi sürekli bir hastalýđý bulunan çocuklar hastanede bir gece kalacaktır.

Gönderen Bozkurt NET:

<http://www.ulkuocagi.net>

Bu Haberin Adresi:

<http://www.ulkuocagi.net/modules.php?name=News&op=NEArticle&sid=2300>